

NOROMECTIN® DUO

Praziquantel Pasta para cavalos

18.7 mg/g de Ivermectina + 141.3 mg/g Praziquantel

Indicações:

Para o tratamento de infestações mistas provocadas por céstodes e nemátodes ou artrópodes, devidas a formas adultas e imaturas de nemátodes, parasitas pulmonares, gasterófilos e céstodes em cavalos:

Nemátodes:

Grandes estrogilios: *Strongylus vulgaris* (adultos e estádios larvares arteriais), *Strongylus edentatus* (adultos e estádios larvares tissulares L4), *Strongylus equinus* (adultos), *Tridontophorus* spp. (adultos) Pequenos estrogilios: *Cyathostomum*: *Cylicocyclus* spp., *Cylicostephanus* spp., *Cylicodontophorus* spp., *Gyalocephalus* spp. (adultos e estádios larvares não inativos nas mucosas) Parascaris: *Parascaris equorum* (adultos e estádios larvares) *Oxyuris*: *Oxyuris equi* (estádios larvares) *Trichostrongylus*: *Trichostrongylus axei* (adultos) Strongyloides: *Strongyloides westeri* (adultos) Habronema: *Habronema* spp. (adultos) Onchocerca: *Onchocerca* spp. microfilaria i.e. oncocercose cutânea Parasitas pulmonares: *Dictyocaulus arnfieldi* (adultos e estádios larvares)

Céstodes:

Anoplocephala perfoliata (adultos), *Anoplocephala magna* (adultos), *Paranoplocephala mamillana* (adultos)

Insetos dípteros:

Gasterophilus spp. (estádios larvares)

Como as infestações em cavalos devidas a céstodes são pouco prováveis de ocorrer antes dos 2 meses de idade, não se considera necessário o tratamento de poldros com idade inferior a 2 meses.

Posologia e via de administração

Administração única. 200 µg de Ivermectina e 1,5 mg de Praziquantel por kg de peso corporal, correspondentes a 1,07 g de pasta por 100 kg de peso corporal. Para assegurar a administração da dose correta, o peso corporal deverá ser calculado com a maior precisão possível, e deverá ser seleccionada a correta graduação da seringa, dado que a subdosagem pode conduzir a um aumento do risco de desenvolvimento de resistência a medicamentos anti-helmínticos.

A primeira graduação dispensa pasta suficiente para tratar 50 kg. Cada graduação subsequente na seringa dispensa pasta suficiente para tratar 50 kg de peso corporal. A seringa deve ser ajustada para a dose calculada através do posicionamento do anel no local adequado do êmbolo. A seringa contém 7,49 g de pasta e dispensa pasta suficiente para tratar 700 kg de peso corporal, de acordo com a dose recomendada.

Intervalo de segurança:

Carne e vísceras: 35 dias.

Não é autorizada a administração a éguas produtoras de leite destinado ao consumo humano.



Noromectin® Praziquantel Duo

- Seringa auto doseadora
- Intervalos de marcação de 50kg peso vivo
- Uma seringa é suficiente para cavalos até 700kg peso vivo
- Sabor a maçã
- Boa margem de segurança: até 3 vezes a dose recomendada



PRODIVET ZN

Av. Infante D. Henrique 333 H – 3º Piso Esc. 41 – 1800-282 Lisboa, www.prodivetzn.pt
geral@prodivetzn.pt

USO VETERINÁRIO
Manter fora da vista e do alcance das crianças 12x 7,49 g seringa

Noromectin® Praziquantel Duo

18,7 mg/g + 140,3 mg/g
Pasta Oral para Cavalos

Ivermectina e Praziquantel

MVG

Para o tratamento de infestações mistas provocadas por céstodes e nemátodes ou artrópodes, devidas a formas adultas e imaturas de nemátodes, parasitas pulmonares, gasterófilos e céstodes em cavalos.

